

집중치료 후 증후군 측정 도구

Post-intensive Care Syndrome Questionnaire (PICSq)

- Korean ver. -



동아대학교 간호학부 인간 중심 중환자 간호 연구팀
부산시 서구 대신공원로 32 동아대학교 간호학부 601호

Citation

- ✓ Jeong, Y. J., & Kang, J. (2019). Development and validation of a questionnaire to measure post-intensive care syndrome. *Intensive and Critical Care Nursing*, 55, 102756.

안내 사항

- ✓ 18문항, 3 요인 (항목 1~6 = 인지 영역, 7~12 = 신체 영역, 13~18 = 정신 영역)
- ✓ 4점 Likert 척도 (0점: 그렇지 않다 ~ 3점: 항상 그렇다)로 측정함
- ✓ 점수가 높을수록 집중치료 후 증후군 정도가 심한 것을 의미함

본 연구팀의 허가 없이 설문지의 무단 복제 및 배포를 금합니다.

한국어판 집중치료 후 증후군 측정 도구

다음 증환자실 치료 이후 새롭게 발생하거나 악화될 수 있는 문제의 목록입니다. 귀하가 증환자실에서 나온 이후 다음 문제를 경험하신 정도에 표시해주세요.

0: 그렇지 않다 1: 가끔 그렇다 2: 자주 그렇다 3: 항상 그렇다

번호	설문문항	0	1	2	3
1	숫자를 외우기 힘들다.	0	1	2	3
2	주변 사람들로부터 '했던 말을 또 한다'는 말을 듣는다.	0	1	2	3
3	길 찾기가 어렵다.	0	1	2	3
4	글을 집중해서 읽을 수가 없다.	0	1	2	3
5	금전 관리가 어렵다.	0	1	2	3
6	날짜, 시간이 헛갈린다.	0	1	2	3
7	관절이 뻣뻣하다.	0	1	2	3
8	손 쥐는 힘이 약하다(예: 글씨 쓰기, 악수하기).	0	1	2	3
9	계단을 오르내리기 힘들다.	0	1	2	3
10	성기능이 저하되었다.	0	1	2	3
11	쉽게 피곤해진다.	0	1	2	3
12	여기저기 아프다.	0	1	2	3
13	마음이 갑갑하다.	0	1	2	3
14	악몽을 꾸다.	0	1	2	3
15	걱정이 많다.	0	1	2	3
16	짜증이나 화가 늘었다.	0	1	2	3
17	쉽게 놀란다.	0	1	2	3
18	희망이 없다.	0	1	2	3

본 연구팀의 허가 없이 설문지의 무단 복제 및 배포를 금합니다.